

FECHA	
HORARIO	
HABITACIÓN	
NOMBRE Y APELLIDO	

EL PACIENTE DEBE CUMPLIR UN AYUNO NO MENOR A 4HS. (SIENDO LO IDEAL 6 HS.) DE ELEMENTOS SÓLIDOS, PUDIENDO TOMAR LÍQUIDOS.

- 1) Los pacientes deben traer colocada una vía intravenosa permeable, con llave de 3 vías y aguja no mayor a calibre 21G, siendo preferible 18G.
- 2) En las TAC de abdomen y pelvis, 2hs. antes del estudio, debe suministrarse la sustancia de contraste oral, según las instrucciones que se adjuntan en el frasco que se remite.
Debe considerarse que en los pacientes que presentan patologías colónicas, la misma debe administrarse con una antelación no menor a 4hs.
El contraste oral no es necesario que sea retenido por el paciente.
- 3) El paciente debe traer leído y firmado el consentimiento que le ha sido entregado.
- 4) El paciente debe presentarse en este servicio con un certificado firmado por el médico responsable, donde indique que lo anteriormente solicitado se ha cumplido. Caso contrario, el estudio no será realizado y deberá reprogramarse.

ATENCIÓN PACIENTES DIABÉTICOS

Si usted es diabético y está bajo tratamiento con Metformina (D.B.I.), debe suspender la administración de esta medicación 72 hs. Antes de realizar la tomografía con contraste.
Ante cualquier duda, por favor realice la consulta con su medico tratante.