

**PAUTAS DE ALARMA PARA EL ALTA DE PACIENTES CON
TRAUMATISMO DE CRANEO ENCEFALICO**

Al no haberse encontrado, durante la evaluación médica y a través de los estudios realizados, evidencias de que exista una lesión que impida el alta sanatorial, deberá tener en cuenta que se pueden presentar complicaciones a las horas y aún días posteriores al hecho. Es por ello que resulta importante mantenerse en alerta durante las primeras 24 horas, por lo que se recomienda estar acompañado de una persona confiable durante ese período.

Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas, consulte en forma urgente o llame al **4129-5100** o **5778-1545 (EMERGENCIAS, Riesgo de vida)**:

- NAUSEAS O VÓMITOS.
- MAREOS, VÉRTIGO.
- CEFALEA INTENSA.
- CONFUSIÓN O CONDUCTA EXTRAÑA.
- SOMNOLENCIA O DIFICULTAD CADA VEZ MAYOR PARA DESPERTAR AL PACIENTE.
- HIPERTENSIÓN O HIPOTENSIÓN ARTERIAL, PULSO MUY LENTO O MUY RAPIDO.
- PÉRDIDA DE SANGRE O LÍQUIDO ACUOSO POR NARIZ U OIDOS.
- RESPIRACIÓN ANORMAL.
- ALTERACIÓN EN LA VISIÓN: VISIÓN DOBLE, MOVIMIENTO OCULAR ANORMAL, DILATACIÓN DE UNA PUPILA (PARTE NEGRA DEL OJO) MUCHO MAS GRANDE QUE LA OTRA.
- ALTERACIÓN EN EL HABLA.
- DEBILIDAD O PÉRDIDA DE LA FUERZA Y/O SENSIBILIDAD DEL BRAZO O LA PIERNA.
- CONVULSIONES.
- PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA.