

Recuerde SIEMPRE traer DNI, Medicaard, Orden Médica y Calendario de Vacunación del niño/a que recibirá la vacuna.

➤ **INDICACIONES PREVIAS** a la aplicación de las vacunas

Sólo para las VACUNAS SABIN y ROTAVIRUS, el niño/a se deberá presentar con 60 minutos de ayuno (líquido y sólido).

➤ **INDICACIONES POSTERIORES** a la aplicación de las vacunas

INDICACIONES GENERALES PARA VACUNAS INYECTABLES

- Deberá comunicarse con su médico pediátrico si el niño/a presenta algún síntoma que no hubiera sido indicado como parámetro normal por el enfermero al momento de la aplicación.
- **RECUERDE QUE LUEGO DE APLICARSE CUALQUIER VACUNA INYECTABLE**, puede presentar fiebre (durante 24 a 48 hs.) y/o inflamación local (rubor, dolor y calor).

SE PERMITE:

- ✓ Suministrar paños fríos en el lugar de aplicación si llegara a presentarse enrojecimiento, hinchazón, y/o dolor.
- ✓ Realizar actividad normalmente (bañarse, comer, realizar actividad física).
- ✓ Solo con indicación de su médico pediatra, administrar antitérmicos para prevenir fiebre.

SE DEBE EVITAR:

- ⊗ Masajear la zona de aplicación.
- ⊗ Recibir vacunas ante la presencia de fiebre.

INDICACIONES PARA VACUNAS ESPECÍFICAS

➤ **SABIN (Opvero, Polio Oral, Poliomielitis)**

- Deberá permanecer 30 minutos más en ayuno (líquido y sólido).
- Si presenta vómitos durante los 30 minutos posteriores a la administración de la vacuna, se deberá repetir la dosis por única vez.

➤ **TRIPLE VIRAL (MMR, Trimovax)**

- Entre los días 7 y 10, después de la aplicación puede aparecer fiebre que generalmente es menor a 38.5° C.
- Eventualmente se presenta erupción en la piel, que desaparece espontáneamente.

➤ **B.C.G.**

- Recordar que en el sitio de la aplicación aparecerá una pápula que desaparecerá después de media hora de aplicación. Posteriormente, aparecerá una mácula (mancha roja) durante la primera semana y que se endurece durante la segunda semana; entre la 4ª y 6ª semana aparecerá un nódulo. El nódulo en ocasiones se abre (úlceras) y deja escapar serosidad, la misma que deberá ser lavada con agua y jabón. La costra aparecerá entre las semanas 6 y 12, la cual, al secarse cae dejando generalmente una cicatriz que dura toda la vida.
- No aplicar sustancias o medicamentos en el sitio de la aplicación. Únicamente debe realizar limpieza suavemente, con agua y jabón.

➤ **ROTAVIRUS (Rotarix, Rotateq)**

- Si el paciente devuelve la vacuna, NO se repite la dosis.